
INFORMATIVA PER L'ESECUZIONE DEL TEST HIV

Il virus dell'HIV ((Human Immunodeficiency Virus) è responsabile di un danno cronico e progressivo a carico delle difese immunitarie dell'organismo provocando, quindi, un indebolimento progressivo del sistema immunitario aumentando il rischio sia di tumori che di infezioni da parte di virus, batteri, protozoi e funghi. La Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) rappresenta lo stadio clinico terminale dell'infezione causata dal virus dell'HIV.

L'infezione da HIV può essere trasmessa tramite rapporti sessuali promiscui e /o non protetti o contaminazione con sangue infetto. Può inoltre essere trasmessa da madre infetta al figlio durante la gestazione, al momento del parto o con l'allattamento.

L'andamento dell'infezione cronica per molti anni è asintomatico e solo l'effettuazione di un prelievo ematico per la ricerca di anticorpi HIV (test) è in grado di diagnosticare la presenza del virus nell'organismo. Il trattamento dell'HIV riducendo la carica virale presente nell'organismo consente di ridurre fortemente la trasmissione dell'infezione da HIV nonché la comparsa dell'AIDS.

L'accertamento della positività al test può essere effettuato su diretta richiesta dell'interessato o nell'ambito degli accertamenti diagnostici; in ottemperanza alle attuali normative di legge viene richiesto l'espressione di un consenso informato scritto per l'effettuazione del prelievo.

Il test viene effettuato tramite un prelievo venoso. I tempi di attesa per ottenere il risultato del test sono di tre giorni.

Le indagini di laboratorio vengono eseguite rispettando il diritto all'anonimato ed alla protezione dei propri dati personali sensibili.

Preso i Laboratori Analisi Aziendali utilizziamo una ricerca combinata, con metodica in chemiluminescenza, di anticorpi (anticorpi anti HIV 1, gruppo M e gruppo O, e HIV 2) e dell'antigene p24, con una specificità del 99.5%.

In caso di risultato dubbio o reattivo positivo del test HIV1/HIV2 il laboratorio in automatico esegue il test di conferma per la diagnosi di HIV di secondo livello tramite metodica Immunoblotting.

Se il risultato del test HIV è:

- **NON REATTIVO.** Questo risultato indica che lei, al momento del prelievo, è sieronegativo, vale a dire che non ha evidenza sierologica di infezione da HIV. Tale risposta, in assenza di "comportamenti o eventi a rischio di contagio per HIV" nei tre mesi precedenti il prelievo può considerarsi conclusiva. Nel caso contrario è consigliabile ripetere il test una volta al mese per i due mesi consecutivi. Sino a conclusione dell'indagine è opportuno osservare le precauzioni per la trasmissione del virus.
- **REATTIVO CONFERMATO:** verrà inviato presso l'U.O. di Malattie Infettive per un counselling post test durante il quale le saranno fornite le informazioni necessarie sul significato dell'esito del test, sugli esami da effettuare e sulle indicazioni per il trattamento.

Voglio che il test venga eseguito in anonimo. In tal caso il referto riporterà un codice alfanumerico costituito dalla prima e terza lettera del cognome, la prima e la terza lettera del nome, seguito dalla data di nascita in formato ggmmaaaa e la lettera indicante il genere.

Data _____

Firma dell'utente _____ Firma del medico _____

